

- fissare la fasciatura con una retina elastica tubolare (in vendita in farmacia o nei supermercati), che si infila con facilità dalle gambe attorno all'addome del piccolo. Non usare cerotti che possono irritare la pelle delicata del neonato.

È necessario ripetere la medicazione ogni qualvolta si cambia il pannolino, se la garza si bagna di pipì.

Una volta caduto (solitamente dopo una - due settimane dal parto) il moncone (che al momento della separazione è costituito da un moncherino nero, di consistenza duro-ligneo), occorre continuare le medicazioni ancora per 1 giorno applicando 2 gocce di Merbromina (Mercurio cromo) sull'ombelico e coprire con una garza sterile fissandola successivamente con una rete elastica.

Non è infrequente osservare sulla ferita ombelicale la presenza di scarse tracce sierose o di crosticine che vanno allontanate con l'impiego di soluzione fisiologica.



Medicazione del cordone ombelicale





Indicazioni

Per favorire la caduta del moncone ombelicale ed evitare la comparsa di infezioni è necessario medicarlo almeno due volte al giorno con salviettine sterili disinfettanti (CicaMil), o in alternativa con argento etallico/benzoperossido (Katoxyn).

L'**obiettivo** è quello di favorire la disidratazione e di conseguenza la mummificazione (cioè il processo di essiccamento) del cordone per accelerarne la caduta.

COME si PROCEDERE

Per la disinfezione del funicolo si procede nel modo seguente:

- Lavarsi le mani
- Rimuovere la medicazione precedente (nel caso in cui la garza rimanesse adesa al cordone, bagnarla con soluzione fisiologica e rimuoverla delicatamente) Prendere con delicatezza l'estremità libera del moncone aiutandosi con una garza sterile asciutta;

1) detergere l'attaccatura del cordone con le salviettine sterili disinfettanti (CicaMil), mantenere in sede la salvietta medicata per 3-4 minuti; rimuoverla ed avvolgere il moncone con una garza sterile e coprirlo con una rete elastica.

2) detergere l'attaccatura del moncone con soluzione fisiologica, sollevare il moncone con garza sterile asciutta, applicare argento etallico/benzoperossido (Katoxyn) sotto e sopra il moncone, ed avvolgere il moncone con una garza sterile e coprirlo con una rete elastica.

- Non abbiate paura di causare bruciori al neonato in quanto il moncone è privo di sensibilità. Può capitare che il neonato pianga durante la medicazione non per effetto del disinfettante o del dolore, ma perché infastidito dal contatto con salviettine sterili disinfettanti (Cicamil) o con argento etallico/benzoperossido (Katoxyn) in quanto sono freddi;